

1.-Título: INTERVENCIONES NIC EN LA PRÁCTICA CLÍNICA EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

Autores: Daniel Fernández García ,Ernestina Fernández Oblanca, Elena Nista Juan Rosa Sabugal Alvarez, Elena Alonso Fernández, Pilar Urdiales Gutiérrez.

Hospital: Complejo Asistencial Universitario de León

Ciudad: León

Introducción: El incremento de la utilización de los diagnósticos enfermeros y del proceso enfermero dentro de la práctica ha conducido a la necesidad de desarrollar una clasificación universal y comprensible de las intervenciones enfermeras que sean congruentes con el proceso de cuidados sistemático de pacientes.

Palabras: Neonatología, enfermería, UCI neonatal, intervenciones, NIC

Justificación: La utilización de las intervenciones NIC dentro de la etapa de planificación y en el momento de efectuar la documentación del plan podría facilitar el estudio de la efectividad y costes de los tratamientos que llevan a cabo las enfermeras además de servir de instrumento para desarrollar una medida del trabajo enfermero

Objetivos: El objetivo del estudio fue describir y analizar las intervenciones enfermeras NIC realizadas en la práctica clínica por las enfermeras de una unidad de cuidados intensivos neonatales.

Material: Estudio descriptivo llevado a cabo en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) diseñado para examinar las intervenciones enfermeras en cuidados neonatales críticos utilizando la Clasificación NIC.

Método: Toda la información quedó registrada en una base de datos creada con el programa informático Epi Info que se utilizó también para la realización del análisis estadístico con las pruebas de chi-cuadrado, chi-cuadrado para tendencias, ANOVA y regresión logística.

Resultados: Se recogieron un total de 283 registros de 44 neonatos ingresados de peso medio 1705,5 y 14,3 días de edad. Se han realizado un total de 8861 intervenciones NIC. El mayor porcentaje de intervenciones (47,1%) pertenecen al dominio fisiológico complejo, seguido del fisiológico básico (17,7%). Por turno se realizaron un 40,1%, 30,6% y 29,1% en mañana, tarde y noche.

Conclusiones: El porcentaje mayor de intervenciones NIC pertenecen al campo fisiológico complejo aunque se puede concluir que en la práctica clínica la solución de problemas no sólo depende de intervenciones de éste área sino de de otras áreas como la familia, intervención clave en el cuidado neonatal.

Bibliografía: * McCloskey JC, Bulecheck GM, editores. Clasificación de Intervenciones de Enfermería. 3ªed. Barcelona: Elsevier; 2001. *Bulecheck GM, Butcher HK, McCloskey Dochterman J, editores. Clasificación de Resultados de Enfermería. 5ªed. Barcelona: Elsevier; 2009. *Johnson M, Bulechek G, McCloskey Dochterman J, Maas M, Moorhead S, editores. Diagnósticos enfermeros, Resultados e Intervenciones. Interrelaciones NANDA, NOC, NIC. 2ªed. Madrid: Elsevier; 2006. *Hajewski, C, Maupin JM, Rapp DA, Sitterding M, Pappas J. Implementation and evaluation of nursing interventions classification and nursing outcomes classification in a patient education plan. Journal of Nursing Care Quality 1998;12(5):30-40.