

2.- Título: MANEJO AL ALTA NEONATAL DE LOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA

Autores: "Patricia Barrue Galiano", Carmen Ballester Taús, Ana Martínez Cano, Laura Martínez Moreno. Ana Moliner Monedero. Antonia Valero Cardona.

Hospital: Hospital General de Castellón. Servicio de Neonatología

Ciudad: Castellón

Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana

Introducción: La obligatoriedad de realizar un alta de Enfermería desde las unidades neonatales a las unidades de pediatría de los centros de salud para la continuidad de los cuidados de enfermería, nos planteó la necesidad de incorporar el término de diagnóstico de Enfermería como rol de Enfermería. El uso de los Diagnósticos de Enfermería nos permite delimitar los problemas y programar los cuidados que cada niño precisa, a la vez que es una herramienta para transmitir la información de continuidad en los cuidados a nuestros compañeros.

Palabras clave: Diagnósticos de Enfermería, Neonatología, Enfermería Neonatal, Continuidad en los Cuidados.

Justificación del estudio: Necesidad de valoración y aplicación de los diagnósticos de enfermería

Objetivos del estudio: 1. Valorar la facilidad de manejo de los diagnósticos de Enfermería en Neonatología. 2. Identificar y valorar los diagnósticos de enfermería más habituales.

Material: ? Altas Enfermería Sección Neonatología ? Encuesta de manejo de la Clasificación de Diagnósticos de Enfermería ? Revisión bibliográfica, sobre diagnósticos y modelos de enfermería

Método: Estudio no experimental cuantitativo transversal retrospectivo ?Periodo estudiado : Noviembre 2009 a Enero 2011 ?Muestra estudiada: Altas de enfermería realizadas durante dicho periodo, nº 703 revisadas ?Encuesta: Realizada al personal de Enfermería de la Unidad de Neonatología , nº 23 enfermeros

Resultados del estudio: A) Al primer objetivo propuesto encontramos los siguientes resultados: - El 65'2% del personal de enfermería tenía conocimientos previos sobre taxonomía NANDA. - El 100% del personal considera que el informe de enfermería facilita la recepción del paciente a otras unidades hospitalarias o a Atención Primaria - El 73'9% considera que la taxonomía NANDA no expresa los diagnósticos de enfermería en Neonatología. - El 100% del personal considera que es necesario formarse más o mejor en la utilización de la taxonomía NANDA. - El 86'9% cree que la información administrada al cuidador le resulta útil y fácil de comprender. B). Los resultados al segundo objetivo propuesto son: **DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA** más utilizados.- 1. Déficit de autocuidados: (baño/higiene - vestido/acicalamiento - uso WC) 209 2. Lactancia materna eficaz 218 3. Lactancia materna ineficaz 109 4. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 46 5. Patrón respiratorio ineficaz 47 6. Lactancia materna interrumpida 27 7. Limpieza ineficaz de las vías aéreas 23 8. Alteración de los procesos familiares * DdE: Riesgo de deterioro parental 12 9. Riesgo de aspiración 12 10. Riesgo de asfixia 1 11. Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal 13 12. Alteración en el desarrollo y el crecimiento* DdE: Retraso en el crecimiento y desarrollo 13 13. Alteración en el patrón del sueño* DdE: Deterioro del patrón del sueño 6 14. Patrón de alimentación ineficaz del lactante 5 15. Riesgo potencial de sobreesfuerzo del cuidador* DdE: Riesgo de cansancio en el desempeño del rol del cuidador 11 16. Alteración de la eliminación 13 17. Estreñimiento 2 18. Diarrea 1 19. Riesgo de alteración de la mucosa oral 3 20. Déficit de conocimientos del cuidador 2 De las 703 altas revisadas, 120 no tenían anotado ningún diagnóstico (17'1%)

Conclusiones: . Por los resultados, observamos que a pesar de tener conocimientos teóricos sobre los diagnósticos de enfermería, es dificultoso ponerlos en práctica. . Esta dificultad se ve incrementada porque la experiencia con la taxonomía NANDA en el ejercicio profesional no había sido utilizada por la mayoría de los encuestados. . Se refleja la necesidad del personal de un mayor conocimiento para el manejo de esta taxonomía. . Casi todos los diagnósticos de enfermería , encontrados en la búsqueda bibliográfica, están pensados para adultos . Tras analizar los diagnósticos relacionados con lactantes y recién nacidos observamos que son escasos e inespecíficos en su contenido, lo que nos resulta mas dificultosa su aplicación en la practica diaria. . Excepcionalmente queremos destacar la gran importancia que se da al diagnostico relacionado con la Lactancia Materna, lo que demuestra la concienciación del personal de enfermería. . A partir de los resultados obtenidos de los diagnósticos al alta observamos que tendemos a utilizar aquellos referentes al autocuidado y a la alimentación; lo que nos viene a reforzar la segunda conclusión. "Todo esto nos lleva a concluir la necesidad de una taxonomía propia que se ajuste a las necesidades de nuestros pequeños pacientes"

Bibliografía: - Marriner-Tomey A.M., Alligood MR. Modelos y teorías en enfermería... Madrid: Elsevier;2007 - Nanda Internacional. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificaciones. Madrid: Elsevier;2005-2006 - Morales Gil IM, García Piñero JM.Cuidados intensivos pediatricos.Serie cuidados avanzados.Madrid: DAE; 2010 - www.perso.wanadoo.es/aniorte-nic/index.html. - www.terra.es/personal/duenas/diagnos.htm